

- Aktywne infekcje (bakteryjne, wirusowe, grzybicze)
- Choroby skóry w miejscu tatuażu (np. Łuszczyca, Atopowe zapalenie skóry, liszaj, opryszczka)
- Choroby zakaźne przenoszone przez krew (np. Wirusowe zapalenie wątroby typu B, Wirusowe zapalenie wątroby typu C, HIV — tu decyzja zawsze z lekarzem)
- Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. Hemofilia)
- Silne reakcje alergiczne na barwniki lub metale
- Ciąża i okres karmienia piersią
- Choroby przewlekłe (np. Cukrzyca — szczególnie niewyrównana)
- Choroby autoimmunologiczne (np. Toczeń rumieniowaty układowy)
- Skłonność do bliznowców (keloidów)
- Osłabiona odporność, przeziębienie
- Przyjmowanie leków immunosupresyjnych lub sterydów
- Leki rozrzedzające krew (np. Aspirin)
- Alkohol lub narkotyki przed zabiegiem (zwiększają krwawienie i ryzyko powikłań)
- Niektóre antybiotyki i leki światłouczulające
- Kuracja IZOTEK i jego pochodne
- Świeże rany, oparzenia, podrażnienia w okolicy planowanego tatuażu
- Intensywna opalenizna lub świeże poparzenie słoneczne
- Liczne znamiona lub podejrzane zmiany skórne (najpierw kontrola dermatologiczna)